



www.lasy.gov.pl



Lasy Państwowe

100 LAT
1924-2024
Lasów Państwowych

Spotkanie z Kołami Łowieckimi w sprawie intensyfikacji działań w związku z ASF.

Człuchów, 06.08.2024 r.



Tematami spotkania będą:

1. Intensyfikacja działań w związku z ASF.
2. Zarządzanie populacją dzika w związku z wirusem ASF.
3. Analiza pozyskania dzików na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Czulów.



Nadleśnictwo Człuchów zostało zobligowane przez RDLP w Szczecinku do:

1. podjęcia niezwłocznych działań w celu maksymalnej intensyfikacji odstrzału planowego i sanitarnego dzików (w pierwszej kolejności warchlaków i przelatków) w nadzorowanych oraz zarządzanych obwodach łowieckich w ramach OHZ;
2. zorganizowania spotkania z myśliwymi, przypomnienia i zobowiązania ich do stosowania oraz przestrzegania zasad bioasekuracji podczas realizacji odstrzału dzików;



3. stosowania na parkingach leśnych koszy na śmieci z zamknięciem, które zabezpieczają przed dostępem zwierząt do zawartości oraz na bieżąco prowadzić ich opróżnianie i wywóz,
4. ponowienia kampanii informacyjnej w zakresie bioasekuracji w związku z ASF wśród myśliwych, na parkingach leśnych, tablicach informacyjnych nadleśnictw, leśnictw, leśnych pensjonatów i innych miejsc zakwaterowania myśliwych;



Uwaga!

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
- choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;
- afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamkniętych pojemników na śmieci.



Attention!

Chief Veterinary Officer informs that:

- african swine fever (ASF) has occurred in: Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland;
- the disease poses a threat to millions of pigs and wild boar, and it causes tremendous economic losses;
- african swine fever, which is not dangerous to humans, can be transmitted by food.

Please place leftover food only in lockable trash cans.



Achtung!

Der leitende Amtstierarzt informiert:

- die Afrikanische Schweinepest wurde in: Russland, Weißrussland, Ukraine, Litauen, Lettland, Estland und Polen bestätigt;
- diese Krankheit bedroht Millionen Haus- und Wildschweine und verursacht große wirtschaftliche Verluste;
- Lebensmittel können die für den Menschen ungefährliche Krankheit übertragen.

Bitte werfen Sie Speisereste nur in verschlossene Müllbehälter.



Внимание!

Главный ветеринарный врач сообщает, что:

- случаи африканской чумы свиней выявлены в: России, Беларуси, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Польше;
- болезнь представляет собой угрозу для миллионов свиней и кабанов, а также приводит к огромному экономическому ущербу;
- это неопасное для человека заболевание может передаваться через пищу.

Просим выбрасывать остатки пищи только в закрытые контейнеры для мусора.



INSPEKCYJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARI
W SZCZECINIE



Nadleśnictwo Człuchów

Dlaczego tu nie ma śmietnika?

Zwierzęta leśne łatwo dobierają się do śmieci szukając pożywienia.

Trują się nimi, zaplątują w opakowania.

Pusta butelka waży mniej niż pełna, możesz zabrać ją ze sobą.

Śmieci segregujemy tam gdzie jest taka możliwość, tutaj takiej nie ma.



www.czluchow.szczecinek.lasy.gov.pl






Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu 3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale i tkankach (zwłaszcza surowych i niedogotowanych) nawet do **6-ciu** miesięcy.

1. Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla naszego zdrowia i życia.

2. Drogi zakażenia


Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy). Do zakażenia może również dojść przez stosowanie skażonej paszy, wody oraz karmienie zwierząt odpadami kuchennymi zawierającymi nieprzetworzone mięso chorych świń lub dzików.





OGNISKA ASF

Liczba ognisk ASF stwierdzonych w 2023r. oraz 2024r. na terenie województwa pomorskiego



— Liczba ognisk ASF stwierdzonych od początku roku 2024 na terenie województwa pomorskiego


— Liczba ognisk ASF stwierdzonych od początku roku 2023 na terenie województwa pomorskiego



Las Państwowy

Mapa ASF – stan na 19.07.2024r.

www.lasy.gov.pl





Zasady bioasekuracji podczas realizacji odstrzału dzików



**Wytyczne odnośnie stosowania zasad
bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań
oraz w czasie pobierania próbek od dzików do
badań laboratoryjnych w kierunku ASF na
obszarach objętych restrykcjami w związku
z ASF**

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożenia:

1. Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.
2. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”.
3. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po oględzinach i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji.



4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale.
5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.
7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
8. Na obszarze ochronnym oraz na obszarach nie objętych restrykcjami dopuszcza się patroszenie na łowisku przy czym zaleca się zachowanie powyższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików:

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi.
2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.
3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików.
4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.



Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF:

1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.
2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni.
3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.



4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii.
5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików:

1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.
3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.




ANALIZA POZYSKANIA DZIKÓW

Analiza pozyskania dzików wg RPŁ 2024/2025 od IV.2024 do 31.VII.2024

Obwód łowiecki	Plan odstrzału wg RPŁ 2024/2025	IV.2024	V.2024	VI.2024	VII.2024	Wykonanie na 31.07.2024	Pozostało do wykonania
289	32	2	1	0	0	3	29
290	22	10	4	3	5	22	0
316	47	16	8	1	7	32	15
302	20	3	3	0	2	8	12
304	68	15	4	1	3	23	45
315	10	5	2	0	6	13	-3
309	28	8	3	1	2	14	14
310	67	5	2	0	1	8	59
305	25	8	9	7	6	30	-5
311	30	4	1	1	1	7	23
312	23	2	3	3	1	9	14
303	54	4	2	5	2	13	41
RAZEM	426	82	42	22	31	182	244




Analiza pozyskania dzików wg RPŁ 2024/2025 od IV.2024 do 31.VII.2024






Analiza pozyskania dzików wg RPŁ 2024/2025 od IV.2024 do 31.VII.2024



Analiza pozyskania dzików sanitarnych od IV.2024 do 31.VII.2024


Obwód łowiecki	Plan sanitarnych dec. Wojewody 2024r.	IV.2024	V.2024	VI.2024	VII.2024	Wykonanie na 31.07.2024	Pozostało do wykonania
289	20	6	5	4	2	17	3
290	15	2	1	2	2	7	8
316	20	9	6	1	2	18	2
302	10	0	0	2	2	4	6
304	20	0	5	4	2	11	9
315	8	0	1	1	0	2	6
309	32	5	4	2	3	14	18
310	30	0	1	2	2	5	25
305	5	0	0	1	0	1	4
311	5	0	0	0	0	0	5
312	5	2	0	1	0	3	2
303	22	6	5	9	2	22	0
RAZEM	192	30	28	29	17	104	88

Analiza pozyskania dzików sanitarnych od IV.2024 do 31.VII.2024






Analiza pozyskania dzików sanitarnych od IV.2024 do 31.VII.2024






Analiza wykonania planu odstrzału dzików (planowe i sanitarne) na dzień 31.07.2024r.



Plany odstrzału DZIKÓW i ich łączna realizacja w obwodach nadzorowanych i zarządzanych

Obwód łowiecki i	Sezon łowiecki	Plan odstrzału minimalny wg RPŁ	Plan odstrzału sanitarnego	Zrealizowany odstrzał z planu w RPŁ	Zrealizowany odstrzał sanitarny	Ubytki	Powierzchnia obwodów łowieckich	Zrealizowany odstrzał łącznie z odstrzałem sanitarnym oraz ubytkami	Intensywność zrealizowanego odstrzału łącznie z odstrzałem sanitarnym z 1000 ha powierzchni obwodu
289	2024/2025	32	20	3	17	0	6525,3	20	3,06
290		22	15	22	7	0	7185,8	29	4,04
316		47	20	32	18	0	8629,8	50	5,79
302		20	10	8	4	0	4269,1	12	2,81
304		68	20	23	11	0	7124,6	34	4,77
315		10	8	13	2	0	4365,8	15	3,44
309		28	32	14	14	0	6846	28	4,09
310		67	30	8	5	0	6179,4	13	2,10
305		25	5	30	1	0	4885,9	31	6,34
311		30	5	7	0	0	4915,6	7	1,42
312		23	5	9	3	0	7730,4	12	1,55
303		54	22	13	22	2	5930,7	37	6,24
RAZEM		426	192	182	104	2	74588,4	288	3,86

Intensywność zrealizowanego odstrzału łącznie z odstrzałem sanitarnym z 1000 ha powierzchni obwodu



www.lasy.gov.pl

Dziękuję za uwagę